

<p>Maladies infectieuses :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Abscès, méningite * Etat grippal ou COVID-19 * Gonococcie * Herpès génital, urétrite non spécifique * Mononucléose infectieuse * Rougeole, oreillons, rubéole, varicelle, infection par le virus West Nile * Tuberculose, brucellose, toxoplasmose 	<p>Attendre l'entière guérison</p> <p>Attendre 10 jours après contact étroit avec un cas positif Attendre 14 jours après le début des symptômes ou après la date du test positif</p> <p>Attendre 12 mois après arrêt du traitement Attendre la résolution de tous les symptômes</p> <p>Attendre 6 mois après guérison Attendre 4 semaines après guérison</p> <p>Attendre 2 ans après guérison</p>
Néphropathie aiguë	Attendre 5 ans après guérison et demander conseil au médecin traitant
Paludisme	<p>La notion de séjour ou de voyage dans une région impaludée, avec ou sans traitement préventif, doit écarter le don pendant au moins 4 mois.</p> <p>Au-delà de la période de 4 mois et jusqu'à 3 ans, une recherche des anticorps spécifiques du paludisme sera effectuée. Si cette recherche est négative, le don est autorisé.</p> <p>La notion de symptomatologie ou la confirmation biologique de paludisme est une contre-indication définitive au don.</p>
Piercing, tatouage	6 mois
Psoriasis	A écarter s'il est très étendu ou nécessitant un traitement systématique itératif
Maladies du tractus respiratoire	Attendre la résolution de tous les symptômes
Traitement	<p>Des donneurs recevant un traitement doivent être en principe écartés jusqu'à l'arrêt du traitement. La demi-vie et les interactions possibles doivent être prises en compte.</p> <p>Les donneurs sous traitement à potentiel tératogène ou pouvant s'accumuler dans les tissus doivent être écartés pour une période qu'il faut évaluer pour chaque produit.</p> <p>Les donneurs sous antiagrégants plaquettaires peuvent donner du sang total. Leurs plaquettes ne sont</p>

